

4

Rivastigmin



+ Fordele



Forsinke
sygdomsudvikling



Opfølgning fra
Demensklínik



Hjælp til
medicin-
dosering/
givning



Mindske
adfærds-
ændring



Findes som
både pille
og
plaster

÷ Ulemper



Opfølgning
fra Demensklínik




Hjælp til medicin-
dosering/givning



Medicin-
bivirkning



Tages 2
gange
dagligt



Skal
optrappes x 3

4

Donepezil



+ Fordele



Forsinke
sygdomsudvikling



Tages 1 gang



Mindske
adfærds-
ændring



Hjælp til
medicin-
dosering/
givning



Opfølgning
fra
Demensklínk

÷ Ulemper



Findes kun i pilleform




Hjælp til medicin-
dosering/givning



Medicinbivirk-
ning



Opfølgning
fra
Demensklínk



Skal
optrappes x 1

4


Ingen behandling



+ Fordele



Ingen bivirkninger



Ingen betaling



% huske at tage medicin



Færre kontakter fra Demensklinikken

÷ Ulemper



Bekymring hos patienten og pårørende



Adfærdsændring



Udvikling af sygdom



Færre kontakter fra Demensklinikken

4 Træning




+ Fordele



Ingen bivikning



Kan være med til at
bevare
funktionsniveau
længst mulig



Ingen betaling



Adfærdsændring
mindskes



Socialt
samvær

÷ Ulemper



Ude af hjemmet



Faste dage



Transport



Socialt samvær

4

Gode råd til dig og dine pårørende



Bliv udredt også selvom du ikke selv lægger mærke til symptomerne. Lyt til dine pårørende når de oplever, at du ændrer dig

-Pårørende, 55 år

Få snakket om vigtige ting i tide i forløbet

-Pårørende, 63 år

Luk op for tabu og snak med andre om sygdommen

-Patient, 72 år

Fortsæt med at have et socialt liv. Fortsæt med at gøre de ting der gør dig glad og udlev de drømme du kan

-Patient, 56 år

Det er vigtigt at snakke med andre i samme situation. Om små ting i hverdagen - der kan påvirke ens livskvalitet - sorg/glæde, glæde/sorg

-Pårørende, 59 år

Dit liv er ikke det samme som før sygdommen. Der skal laves ændringer. Blandt andet din økonomi, din bolig og arbejdsliv.....

-Patient 55 år

4 Bivirkningskort



Donepzil



Kvalme



Opkastning



Svimmelhed



Nedsat appetit



Diarré



Hovedpine



Søvnløshed

Rivastigmin



Kvalme



Opkastning



Svimmelhed



Nedsat appetit



Diarré



Hovedpine




Mavesmerter

4

Udvikling af demenssygdom over tid



Effekt



4

Donepezil – Rigmastigmin over bivirkninger



10 ud af 100 vil opleve bivirkninger ved henholdsvis Donepezil og Rigmastigmin


4

Tidslinje / Plan for optrapning af medicin



Rivastigmin:

3 optrapninger med
4 ugers mellemrum



Donepezil:

1 optrapning
efter 4 uger



