

# 4

## Rivastigmin



### + Fordele



Forsinke  
sygdomsudvikling




Opfølgning fra  
Demensklíník



Hjælp til  
medicin-  
dosering/  
givning



Mindske  
adfærds-  
ændring



Findes som  
både pille  
og  
plaster

### ÷ Ulemper



Opfølgning  
fra Demensklíník




Hjælp til medicin-  
dosering/givning



Medicin-  
bivirkning



Tages 2  
gange  
dagligt



Skal  
optrappes x 3



# 4

## Donepezil



### + Fordele



Forsinke  
sygdomsudvikling



Tages 1 gang



Mindske  
adfærds-  
ændring



Hjælp til  
medicin-  
dosering/  
givning



Opfølgning  
fra  
Demensklínk

### ÷ Ulemper



Findes kun i pilleform




Hjælp til medicin-  
dosering/givning



Medicinbivirk-  
ning



Opfølgning  
fra  
Demensklínk



Skal  
optrappes x 1



# 4


## Ingen behandling



### + Fordele



Ingen bivirkninger



Ingen betaling



% huske at tage medicin



Færre kontakter fra Demensklinikken

### ÷ Ulemper



Bekymring hos patienten og pårørende



Adfærdsændring



Udvikling af sygdom



Færre kontakter fra Demensklinikken



# 4 Træning




## + Fordele



Ingen bivikning



Kan være med til at  
bevare  
funktionsniveau  
længst mulig



Ingen betaling



Adfærdsændring  
mindskes



Socialt  
samvær

## ÷ Ulemper



Ude af hjemmet



Faste dage



Transport



Socialt samvær





# 4

## Gode råd til dig og dine pårørende



Bliv udredt også selvom du ikke selv lægger mærke til symptomerne. Lyt til dine pårørende når de oplever, at du ændrer dig

-Pårørende, 55 år

Få snakket om vigtige ting i tide i forløbet

-Pårørende, 63 år

Luk op for tabu og snak med andre om sygdommen

-Patient, 72 år

Fortsæt med at have et socialt liv. Fortsæt med at gøre de ting der gør dig glad og udlev de drømme du kan

-Patient, 56 år

Det er vigtigt at snakke med andre i samme situation. Om små ting i hverdagen - der kan påvirke ens livskvalitet - sorg/glæde, glæde/sorg

-Pårørende, 59 år

Dit liv er ikke det samme som før sygdommen. Der skal laves ændringer. Blandt andet din økonomi, din bolig og arbejdsliv.....

-Patient 55 år



# 4 Bivirkningskort



## Donepzil



Kvalme



Opkastning



Svimmelhed



Nedsat appetit



Diarré



Hovedpine



Søvnløshed

## Rivastigmin



Kvalme



Opkastning



Svimmelhed



Nedsat appetit



Diarré



Hovedpine



Mavesmerter




# 4

## Udvikling af demenssygdom over tid



Effekt





# 4

## Donepezil – Rigvastigmin over bivirkninger



10 ud af 100 vil opleve bivirkninger ved henholdsvis Donepezil og Rivastigmin






# 4

## Tidslinje / Plan for optrapning af medicin



### Rivastigmin:

3 optrapninger med  
4 ugers mellemrum



### Donepezil:

1 optrapning  
efter 4 uger

