


4

Kemoterapi



+ Fordele



Nedsætter risikoen
for tilbagefald af
brystkræft



De fleste tåler
kemo bedre
end de frygter



Understøtter dit
behov for aktivt
at gøre noget

÷ Ulemper



Senfølger



Kvalme og træthed



Følefor-
styrrelser
og allergisk
reaktion



Hårtab og evt.
paryk




Nedsat
immunforsvar

4

Antihormon



+ Fordele



Nedsætter risikoen
for tilbagefald af
brystkræft



Tablet behandling



Ikke tidskrævende



Mulighed for at
passe arbejde

÷ Ulemper



Tørre slimhinder
og seksualitet



Knogle-
skørhed,
muskul- og
ledsmerter



Hedeture




Vægtøgning



Humør-
svingninger



+ Fordele



Nedsætter risikoen
for tilbagefald af
brystkræft



Tåles normalt godt



Mulighed for at
passe arbejde
(evt. nedsat tid)



Specifik behandling
for din kræfttype

÷ Ulemper



Allergisk reaktion



Influenza lignende
symptomer



Hjertesvigt



Langvarig
behandling*


*Hver 3. uge i 51 uger

4

Strålebehandling



+ Fordele



Nedsætter risikoen
for tilbagefald af
brystkræft



Virker lokalt



Mulighed for at
passe
arbejde
(evt. nedsat tid)



Understøtter dit
behov for aktivt at
gøre noget


÷ Ulemper



Arvævsdannelse



Hjerte og lunge-
sensfølger



Træthed




Lokale hudgener

4

Zoledronsyre




+ Fordele



Nedsætter risikoen
for tilbagefald af
brystkræft



Tåles normalt godt



Hurtig
behandling



Mulighed for
at passe
arbejde



Styrker
knoglerne

÷ Ulemper



Knoglesmerter



Influenza lignende
symptomer



Tandlæge
hver 6. måned



Blodprøver
hver 6. måned

4

Ingen behandling



+ Fordele



Ingen bivirkninger



Ingen senfølger



Ikke tidskrævende



Mulighed for at
passe
familie og arbejdsliv


÷ Ulemper



Øger risikoen for
tilbagefald



Øget bekymring for
tilbagefald




Tilbagefald = ofte
sygdom der ikke
kan helbredes

4

CDK 4/6 hæmmer



+ Fordele




Nedsætter risikoen
for tilbagefald af
brystkræft



Tabletbehandling



Specifik behandling
for din kræfttype



Forstærker og
forlænger effekten af
hormonbehandling

÷ Ulemper



Ekstra
hospitalsbesøg og
blodprøver



Kvalme,
mavesmerter og
diarré



Påvirker
immun-
forsvaret



Kan påvirke
leveren



Kan påvirke
nyrerne

4

Patienthistorier



Bivirkningerne har ikke været så slemme i mit tilfælde. Så jeg kunne arbejde fuldtid, ved siden af behandlingerne.

-Patient, 39 år

Jeg har set efterbehandlingen som et tilbud, men heller ikke set andre alternativer.

-Patient, 40 år

Jeg tager alt det efterbehandling, jeg kan få for at være på den sikre side.


-Patient, 43 år

Jeg valgte at sige nej, fordi effekten af behandlingen i mit tilfælde ikke ville være stor. Det handlede også om størrelsen af knuden, og at der ikke var metastaser.

-Patient, 72 år

BESLUTNINGSHJÆLPEN™
preview

4 Statistik // Overlevelse efter 15 år (Predict)



- 10 dør pga. anden årsag
- 4 dør pga. kræften
- 1 er i live pga. Zoledronsyre
- 3 er i live pga. Trastuzumab
- 5 er i live pga. antihormon
- 4 er i live pga. kemoterapi
- 73 er i live ved kirurgi alene

Dette er et specialkort og kan derfor ikke redigeres
på BESLUTNINGSHJÆLPER™ byggeplatformen.
Kontakt den ansvarlige ved deling.