

4

Kemoterapi



+ Fordele



Nedsætter risikoen
for tilbagefald af
brystkræft



De fleste tåler
kemo bedre
end de frygter



Understøtter dit
behov for aktivt
at gøre noget

÷ Ulemper



Senfølger



Kvalme og træthed



Følefor-
styrrelser
og allergisk
reaktion



Hårtab og evt.
paryk




Nedsat
immunforsvar

4

Antihormon



+ Fordele



Nedsætter risikoen
for tilbagefald af
brystkræft



Tablet behandling



Ikke
tidskrævende



Mulighed for
at passe
arbejde



Understøtter
dit behov for
aktivt at gøre
noget

÷ Ulemper



Tørre slimhinder
og seksualitet



Knogle-
skørhed,
muskul- og
ledsmerter



Hedeture




Vægtøgning



Humør-
svingninger



+ Fordele



Nedsætter risikoen
for tilbagefald af
brystkræft



Tåles normalt godt



Mulighed for at
passe arbejde
(evt. nedsat tid)



Understøtter dit
behov for
aktivt at gøre noget

÷ Ulemper



Allergisk reaktion



Influenza lignende
symptomer



Hjertesvigt



Langvarig
behandling*


*Hver 3. uge i 51 uger

4

Strålebehandling



+ Fordele



Nedsætter risikoen
for tilbagefald af
brystkræft



Virker lokalt



Mulighed for at
passe
arbejde
(evt. nedsat tid)



Understøtter dit
behov for aktivt at
gøre noget


÷ Ulemper



Arvævsdannelse



Hjerte og lunge-
sensfølger



Træthed



Lokale hudgener

4

Zoledronsyre




+ Fordele



Nedsætter risikoen
for tilbagefald af
brystkræft



Tåles normalt godt



Hurtig
behandling



Mulighed for
at passe
arbejde



Styrker
knoglerne

÷ Ulemper



Knoglesmerter



Influenza lignende
symptomer



Tandlæge
hver 6. måned



Blodprøver
hver 6. måned

4

Ingen behandling



+ Fordele



Ingen bivirkninger



Ingen senfølger



Ikke tidskrævende



Mulighed for at
passe
familie og arbejdsliv


÷ Ulemper



Øger risikoen for
tilbagefald



Øget bekymring for
tilbagefald



Tilbagefald = ofte
sygdom der ikke
kan helbredes

4

Patienthistorier



Bivirkningerne har ikke været så slemme i mit tilfælde. Så jeg kunne arbejde fuldtid, ved siden af behandlingerne.

-Patient, 39 år

Jeg har set efterbehandlingen som et tilbud, men heller ikke set andre alternativer.

-Patient, 40 år

Jeg tager alt det efterbehandling, jeg kan få for at være på den sikre side.


-Patient, 43 år

Jeg valgte at sige nej, fordi effekten af behandlingen i mit tilfælde ikke ville være stor. Det handlede også om størrelsen af knuden, og at der ikke var metastaser.

-Patient, 72 år

BESLUTNINGSHJÆLPEN™
preview

4 Statistik // overlevelse efter 10 år (Predict)



- Patienter dør pga. anden årsag
- Patienten dør pga. kræften
- Patienten er i live pga. Zoledronsyre
- Patienten er i live pga. Trastuzumab
- Patienten er i live pga. antihormon
- Patienten er i live pga. kemoterapi
- Patienten er i live ved kirurgi alene (uden anden tillægsbehandling)

Eksempel: predict.nhs.uk: 53 årige kvinde: Postmenopausal. ER pos., HER2 pos., Tumorgrad 2, størrelse 23 mm. og 2 syge lymfeknuder

