

4


Strålebehandling



+ Fordele



Øger chancen for
at
forblive kræft-fri



Kort behandlingstid




Virker lokalt



En normal hverdag
kan opretholdes


÷ Ulemper



Arvævsdannelse



Lymfødem



Træthed



Hud-
påvirkning



Hjerte og
lunge

4

Zoledronsyre



+ Fordele




Øger chancen for
at
forblive kræft-fri



Styrker knoglerne



Tåles normalt godt



Hurtig behandling

÷ Ulemper



Knoglesmerter



Influenza lignende
symptomer



Tandlæge



Blodprøver

4

Ingen behandling



+ Fordele



Ingen bivirkninger



Ingen senfølger



Ikke tidskrævende



Mulighed for at
passe
familie og arbejdsliv


+ Ulemper




Ingen reduktion i
risikoen for
tilbagefald



Øget bekymring for
tilbagefald



Risiko for nyt
behandlingsforløb



Risiko for
uhelbredelig sygdom

4

Paclitaxel



+ Fordele



Øger chancen for at
forblive kræft-frit



Tåles generelt godt



Kun sparsom kvalme



Kan fortsætte med
de daglige gøremål

+ Ulemper



Allergisk reaktion



Føleforstyrrelser



Tørre
slimhinder



Kan påvirke
immun-
forsvaret



Paryk

4

Epirubicin/Cyclophosphamid



+ Fordele



Øger chancen for at forblive kræft-fri



De fleste tåler kemo bedre end de frygter



Gives hver 2./3. uge




Bekæmper kræftceller i hele kroppen

+ Ulemper



Hjertepåvirkning



Træthed



Kvalme og hårtab



Tørre slimhinder



Kan påvirke immun-forsvaret

4

Capecitabin



+ Fordele



Øger chancen for at forblive
kræft-fri



Tabletbehandling



Kan fortsætte med
de daglige gøremål

+ Ulemper



Hudgener



Hjertesmerter



Diarré



Kan påvirke
immunforsvaret

4

Letrozol/Anastrozol/Exemestan



+ Fordele



Tabletbehandling



Specifik behandling
for din kræfttype



Ikke
tidskrævende



En normal
hverdag kan
opretholdes



Øger chancen
for at forblive
kræft-fri

÷ Ulemper



Hede- og
svedeture



Muskel- og
ledsmerter



Knogle-
skørhed



Vægt



Humør



Påvirkning af
slimhinder og
seksualitet

4

Tamoxifen



+ Fordele



Øger chancen for at
forblive kræft-fri



Tabletbehandling



En normal
hverdag kan
opretholdes



Ikke
tidskrævende



Specifik
behandling
for din
kræfttype

÷ Ulemper



Hede- og
svedeture



Muskel- og
ledsmerter



Påvirkning af
slimhinder og
seksualitet



Vægt



Humør



Risiko for
blodpropper
og kræft i
livmoder



+ Fordele



Specifik behandling
for din kræfttype



Øger chancen for at
forblive kræft-fri



En normal hverdag
kan opretholdes



Tåles normalt godt

÷ Ulemper



Allergisk reaktion



Influenza-lignende
symptomer



Hududslæt



Hjertesvigt

4

Pertuzumab og Trastuzumab



+ Fordele



Specifik behandling
for din kræfttype



Øger chancen for at
forblive kræft-fri



Tåles normalt godt



En indsprøjtning

÷ Ulemper



Allergisk reaktion



Influenza-lignende
symptomer



Diaré



Hjertesvigt



Hududslæt

4

Abemaciclib



+ Fordele



Øger chance for at
forblive kræft-fri



Ikke tidskrævende -
tabletbehandling



Mister ikke håret




Specifik behandling
til din kræfttype

÷ Ulemper



Kvalme,
mavesmerter og
diaré



Kan påvirke
immunforsvaret



Kan påvirke levertal



Træthed

4

Cyclophosfamid/Methotrexat/Fluoruracil



+ Fordele



Øger chancen for at forblive
kræft-fri



Tåles normalt godt



Gives hver 3. uge

+ Ulemper




Kan påvirke
immunforsvaret



Hjertesmerter



Slimhindepåvirkning
og diaré



Træthed

4

Trastuzumab-emtansine (T-DM1)



+ Fordele



Øger chance for at
forblive kræft-fri



Tåles normalt godt



Specifik behandling
for din kræfttype



En normal hverdag
kan opretholdes

÷ Ulemper




Influenza-lignende
symptomer



Hjertesvigt




Kan påvirke
immunforsvaret



Træthed

4

Carboplatin



+ Fordele



Øger chancen for at
forblive kræft-fri



De fleste tåler kemo
bedre end de tror



Gives hver 3. uge




Bekæmper
kræftceller i hele
kroppen

+ Ulemper



Nyrepåvirkning



Træthed



Kan påvirke
immunforsvaret



Slimhindepåvirkning

4

Patienthistorier



Bivirkningerne har ikke været så slemme i mit tilfælde. Så jeg kunne arbejde fuldtid, ved siden af behandlingerne.

-Patient, 39 år

Jeg har set efterbehandlingen som et tilbud, men heller ikke set andre alternativer.

-Patient, 40 år

Jeg tager alt det efterbehandling jeg kan få for at være på den sikre side.


-Patient, 43 år

Jeg valgte at sige nej, fordi effekten af behandlingen i mit tilfælde ikke ville være stor. Det handlede også om størrelsen af knuden og at der ikke var metastaser.

-Patient, 72 år

4

Tidslinje (ER positiv HER2 normal, neoadj.)



Paclitaxel
Hver uge, 12 gange

Epirubicin og
Cyklofosfamid
Hver __ uge, 4 gange

Operation


Strålebehandling
Dagligt i 3-4 uger

Zoledronsyre
Ca. hver 6. måned, 8 gange

Antihormonbehandling
En tablet dagligt i __ år

4

Tidslinje (HER2 positiv, adjuverende)



■ Antistofbehandling
Hver 3. uge, 17 gange

■ Epirubicin og
Cyclophosfamid: Hver __
uge, 4 gange

■ Paclitaxel: Hver uge, 12
gange


■ Strålebehandling
Dagligt i 3-4 uger

■ Zoledronsyre
Ca. hver 6. måned, 8 gange

■ Antihormonbehandling
En tablet dagligt i __ år

4

Tidslinje (HER2 positiv, neoadjuverende)



Antistofbehandling
Hver 3. uge, 17 gange

Paclitaxel: Hver uge, 12 gange

Epirubicin og Cyclophosphamid:
Hver ___ uge, 4 gange


Strålebehandling
Dagligt i 3-4 uger

Zoledronsyre
Ca. hver 6. måned, 8 gange

Antihormonbehandling
En tabl. dagligt i ___ år

4

Tidslinje (ER positiv HER2 normal, adj.)



Operation



Paclitaxel
Hver uge, 9 gange



Epirubicin og Cyclofosfamid
Hver ____ uge, 3 gange



Strålebehandling
Dagligt i 3-4 uger




Zoledronsyre
Ca. hver 6 måned, 8 gange



Antihormonbehandling
En tbl. dagligt i ____ år

4

Tidslinje (ER positiv HER2 normal, adj.)



Operation



Zoledronsyre
Ca. hver 6. måned, 8 gange



Strålebehandling
Dagligt 3-4 uger



Antihormonbehandling
En tablet dagligt i ____år

4

Tidslinje (ER neg HER2 normal, adj.)



Operation



Epirubicin og Cyclofosfamid
Hver__uge, 4 gange



Paclitaxel
Hver uge, 12 gange




Strålebehandling
dagligt i 3-4 uger



Zoledronsyre
Ca hver 6. måned, 8 gange

4

Tidslinje (ER negativ, HER2 normal, neoadj.)



■ Epirubicin og Cyclofosfamid
Hver___ uge, 4 gange

■ Paclitaxel og evt.
Carboplatin
Hver uge, 12 gange

■ Operation

■ Strålebehandling
dagligt i 3-4 uger

■ Capecitabin tbl. hver 3. uge,
6-8 gange

■ Zoledronsyre
Ca. hver 6. måned, 8 gange

