

4

Ingen behandling



+ Fordele



Ingen bivirkninger/
komplikationer efter
behandling



Uændret sædafgang



Ingen sygdommelding



Ingen medicin

÷ Ulemper



Skal leve med
symptomerne



Risiko for forværring



Utryghed / frygt for
forværring

4

Medicin - Alfa blokker (afslapper prostatas muskelceller)



+ Fordele



Veldokumenteret
behandling



Hurtigt indsættende
effekt




Ingen sygdoms
symptomer

Eks. på medicinnavne: Omnic, Tamsulosin, Alfuzosin

÷ Ulemper



Livslang indtagelse af
medicin



Medicinudgifter



Risiko for
bivirkninger,
herunder påvirkning
af sexliv

4

Medicin - 5 alfa reduktase hæmmer (skrumper prostata)



+ Fordele



Veldokumenteret
behandling



Ingen sygemelding




Kan nedsætte behov
for fremtidig
operation

Eks. på medicinnavne: Finasterid, Dutasterid


÷ Ulemper



Livslang indtagelse
af medicin



Medicinudgifter



Risiko for
bivirkninger,
herunder påvirkning
af sexliv



Lang tid til effekt

4


Medicin -PDE-5 Inhibitor (afslapper prostatas muskelceller)



+ Fordele



Veldokumenteret
behandling



Hurtigt indsættende
effekt



Ingen sygemelding



Uændret sædafgang

Eks. på medicinnavne: Cialis, Tadalafil


÷ Ulemper



Livslang indtagelse af
medicin



Risiko for
bivirkninger



Medicinudgifter

4

Transuretral prostata resektion (TUR-P/ Skrælning af prostata ved kikkertoperation)



+ Fordele



Veldokumenteret
behandling



Hjem samme dag



Hurtigt
indsættende
effekt



Lang
holdbarhed



Kort katetertid


÷ Ulemper



Risiko for
komplika-
tioner



Risiko for
blødning



Risiko for
påvirkning af
sexliv



Gener i
efterforløbet



Blodfortynd-
ende medicin
skal pauseres



Ventetid på
operation

4

Transuretral incision af prostata (TUI-P / Snit i prostata ved kikkertoperation)



+ Fordele



Veldokumenteret
behandling



Hjem samme dag



Hurtigt
indsættende
effekt



Lang
holdbarhed



Kort katetertid


÷ Ulemper




Risiko for
komplikationer



Ventetid på indgreb



Risiko for påvirkning
af sexliv



Blodfortyndende
medicin skal
pauseres

4


Transuretral enukleation af prostata (Fjernelse af prostatavæv ved kikkertoperation)



+ Fordele



Veldokumenteret
behandling



Hurtigt indsættende
effekt



Minimal risiko for
blødning



Kort katetertid


÷ Ulemper



Risiko for komplikationer



Ventetid på indgreb



Risiko for påvirkning
sexliv

4

Rezum (Fordampning af prostatavæv ved kikkertoperation)



+ Fordele



Hjem samme dag



Lokal-
bedøvelse



Minimal risiko for
blødning



Lav risiko for
inkontinens


÷ Ulemper



Nyere behandling



Mindre effektiv end
skrælning af prostata



Efterbehandling med
kateter



Lang tid til effekt

4

Mikrobølgebehandling



+ Fordele



Veldokumenteret
behandling



Hjem samme dag



Lokal-
bedøvelse



Ingen
pausering af
blodfortynd-
ende medicin




Lav risiko for
inkontinens

÷ Ulemper




Mindre effektiv end
skrælning af prostata



Efterbehandling med
kateter



Lang tid til effekt



Risiko for påvirkning
af sexliv



+ Fordele



Lokalbedøvelse/
Hjem samme dag



Risiko for
komplikation er lav



Bevaret
normal
sædafgang



Hurtigt
indsættende
effekt



Ingen kateter


÷ Ulemper



Nyere behandling



Mindre effektiv end
skrælning af prostata



Øget risiko for behov
for ny behandling af
prostata



Ventetid på
behandling

4

Prostata embolisering (lukning af blodforsyning til prostata)



+ Fordele



Hjem samme dag



Lokalbedøvelse



Ingen risiko
for
inkontinens



Uændret
sædafgang



Ingen kateter

÷ Ulemper



Nyere behandling



Mindre effektiv end
skrælning af prostata



Blodfortynd-
ende medicin
skal pauseres



Længere-
varende
rygleje



Ventetid på
indgreb

4

Transuretral vaporisation af prostata (Fordampning af prostata væv, kikkertoperation)



+ Fordele



Veldokumenteret
behandling



Hjem samme dag



Hurtig indsættende
effekt, herunder kort
katetertid



Minimal risiko for
blødning


÷ Ulemper



Risiko for komplikationer



Ventetid på operation



Risiko for påvirkning
af sexliv

4


Transvesikal prostatektomi, åben (Fjernelse af prostata væv ved operation gennem maveskindet)



+ Fordele



Veldokumenteret
behandling



Hurtigt indsættende
effekt



Lang holdbarhed



Stor effekt

÷ Ulemper




Kræver
indlæggelse



Risiko for
komplikationer



Øget risiko for
blødning



Risiko for
påvirkning af
sexliv



Blodfortyndende medicin
skal pauseres



Ventetid på
indgreb

4


Robotassisteret prostatektomi (Fjernelse af prostata væv, kikkertindgreb gennem maveskindet)



+ Fordele



Veldokumenteret
behandling



Hurtigt indsættende
effekt



Lang holdbarhed



Stor effekt


÷ Ulemper



Risiko for
komplikationer



Øget risiko for
blødning



Risiko for
påvirkning af
sexliv



Blodfortynd-
ende medicin
skal pauseres



Ventetid på
indgreb

4

Kateter á demeure, transuretralt (Fast kateter gennem urinrøret)



+ Fordele



God
nattesøvn



Hjem samme
dag



Virker med
det samme



Ingen
sygemelding



Ingen
operation



God for
immobile

÷ Ulemper




Livslang
behandling




Risiko for
bivirkninger



Risiko for
blære-
betændelse



Påvirkning af
sexliv



Gener af
kateter



Påvirkning af
sociale liv

4

Kateter á demeure, suprapubisk (Kateter gennem maveskindet)



+ Fordele



Ingen sygemelding



Hjem samme dag



Hurtigt indsættende
effekt



God for immobile

÷ Ulemper



Livslang behandling



Risiko for
bivirkninger



Risiko for infektion



Blodfortyndende
medicin skal
pauseres

4

Ren intermitterende katerisation (Èngangskaterisation)



+ Fordele



Tryghed/Hjælp til
selvhjælp



Hjem samme dag



Hurtigt
indsættende
effekt



Ingen
operation



Ingen
sygemelding

÷ Ulemper



Livslang behandling



Risiko for
bivirkninger



Risiko for infektion



Frygt for ikke at
kunne udføre
proceduren

4

Prostatastent



+ Fordele



Veldokumenteret
behandling



Hjem samme dag



Hurtigt
indsættende
effekt



Lokal-
bedøvelse




Ingen kateter


÷ Ulemper



Mindre effektiv end
skrælning af prostata



Risiko for
komplikationer



Risiko for infektioner

4

Patienthistorier



Jeg var glad for at det kunne foretages i lokal bedøvelse.

67 årig mand til dampbehandling af prostata

Jeg ville ønske at jeg havde fået lavet operationen før.

75 årig mand efter skrælning af prostata

Jeg frygter at blive utæt efter operationen. Det blev min nabo.

65 årig mand

For nu vælger jeg at fortsætte med RIK. Jeg ved hvad jeg har og ønsker ikke at tage risikoen ved operation.

68-mand, der valgte at fortsætte med RIK fremfor operation

4

Komplikationer til operation



Urininkontinens efter operation



98 ud af 100 bliver ikke urininkontinente efter en operation



2 ud af 100 bliver urininkontinente efter en operation

Gælder for operationerne: TUR-P, TUI-P, Vaporisation, Enukleation

Forsnævring i urinrør/blærehals efter operation



95 ud af 100 udvikler ikke forsnævring af urinrøret



5 ud af 100 udvikler forsnævring af urinrøret

Gælder for operationerne: TUR-P, TUI-P, Vaporisation, Enukleation

4

Effekt versus bivirkninger

