

4

Kemoterapi - tostofsbehandling (oxaliplatin)




+ Fordele



Øger chancen for at forblive
rask



Nedsætter risikoen
for tilbagefald



Øger chancen for
effekt i forhold til
enkeltstof

÷ Ulemper



Føleforstyrrelser



Ændret smagssans



Diarré




Kvalme



Hudgener

4

Kemoterapi - enkeltstof (capecitabin-tabletter)



+ Fordele



Øger chancen for at forblive
rask



Nedsætter risikoen
for tilbagefald



Færre bivirkninger
end tostof

÷ Ulemper



Diarré



Kvalme



Hudgener



Ændret smagssans

4

Ingen kemoterapi



+ Fordele



Ingen bivirkninger



Ingen senfølger



Ikke tidskrævende



Nemmere ved at
passe arbejde og
privatliv

÷ Ulemper



Øger ikke chancen for at
forblive rask



Øget bekymring for
tilbagefald



Tilbagefald er ofte
sygdom, der ikke kan
helbredes

4

Patienthistorier



Vi var på vagt overfor kemo, og turde næsten ikke lave planer, men efter at have prøvet det, slapper jeg mere af.

-Patient, 51 år

Jeg tager behandlingen, da jeg griber det håb der er.

-Patient, 48 år

Når lægen fortæller, at bivirkninger måske ikke forsvinder, og at der ikke er stor forskel på, om jeg får behandling eller ej, så er jeg ikke i tvivl. Så vil jeg ikke have behandling. Jeg er blevet 75 år, så det går nok lidt endnu.

-Patient, 75 år

Information på det rigtige tidspunkt er vigtig. Da jeg skulle beslutte, om jeg skulle få nedsat min kemo, havde det været rart at vide, at det er helt almindeligt og at andre også får deres dosis sat ned i deres forløb.

-Patient, 57 år

4

Lav-risiko, eksempel for 100 personer på 65 år opereret for tarmkræft



Dette er et eksempel. Mange andre forhold kan spille ind for den enkelte.

4

Høj-risiko, eksempel for 100 personer på 65 år opereret for tarmkræft



Dette er et eksempel. Mange andre forhold kan spille ind for den enkelte.

