4 Vaccination af gravid

+ Fordele



Effektiv beskyttelse mod Covid-19 infektion



Undgå isolation



Undgå Covid-19 komplikation, fx for tidlig fødsel



Vaccinen krydser ikke moderkagen



Ikke påvist komplikation hos fosteret

÷ Ulemper



Bivirkninger fra vaccinen



Vaccinen er ikke undersøgt på samme måde som hos ikke-gravide



Bekymring om ukendte senfølger af vaccinen hos mor og barn

BESLUTNINGSHJÆLPER™ preview

4 Ikke vaccination af gravid

+ Fordele



Undgå bivirkninger fra vaccinen



Undgå bekymring om vaccinens betydning for kvinden og fosteret

÷ Ulemper



Større risiko for alvorlig sygdom hos mor ved smitte med Covid-19



Risiko for graviditets-komplikationer, herunder for tidlig fødsel



Isolation

BESLUTNINGSHJÆLPER™ preview

4 Vaccination af ammende

+ Fordele



Effektiv beskyttelse af mor og nyfødt mod Covid-19



Opretholdelse af socialt liv



Ikke påvist komplikationer hos barnet



Vaccinen går ikke i modermælken

÷ Ulemper



Risiko for bivirkning hos mor



Vaccinen er ikke undersøgt på samme måde som hos ikke-ammende



Bekymring om ukendte senfølger af vaccinen hos mor og barn

BESLUTNINGSHJÆLPER™ preview

4 Ikke vaccination af ammende

+ Fordele



Undgå bivirkninger fra vaccinen



Undgå bekymring om senfølger af vaccinen hos mor og barn

÷ Ulemper



Risiko for smitte af mor og nyfødt med COVID-19



Isolation



Socialt liv udfordret af krav om hyppige Covid-tests

BESLUTNINGSHJÆLPER™ preview

4 Patienthistorier

Jeg frygter at lande i en form for isolation, hvor man er nødt til at få en test hveranden dag for at komme ud i tilværelsen. På den måde bliver det lidt besværligt at være til under ens barsel, fordi alle andre er "safe" og det er man ikke selv eller ens barn. Det synes jeg er utrygt.

- Ammende, 35 år

Det vigtigste for mig er at være oplyst godt nok til at vide, om jeg skal vælge til eller fra. Jeg har stor tiltro til anbefalingerne.

- Ammende, 25 år

Selvom jeg på nuværende tidspunkt ville sig nej til vaccinen, så er det stadig vigtigere for mig, med det jeg har været igennem (covid-19 sygdom), at undgå sygdommen og de bekymringer som det har givet, og så få vaccinen.

- Gravid uge 30, 33 år, smittet med Covid-19 tidligt i graviditeten

Det vigtigste for mig er, at vaccinen ikke er tilstrækkeligt undersøgt. Jeg vil ikke kunne tilgive, at jeg valgte noget til, som gjorde fosteret sygt.

- Gravid uge 15, 30 år

BESLUTNINGSHJÆLPER™ preview

4 Risiko for smitte med covid-19 under graviditeten hos ikke-vaccinerede kvinder



11 ud af 100 ikke-vaccinerede gravide smittes med covid-19 under graviditeten.
Risikoen for at blive smittet afhænger bl.a. af det aktuelle smittetryk

Kære Kliniker,

Du skal nu ved brug af dette beslutningsstøtteværktøj hjælpe en gravid eller ammende kvinde med at beslutte, om hun vil vaccineres mod covid-19.
Sygdommen og vaccinen er ny for os alle og der sker løbende ændringer i vores viden. Du kan derfor med fordel orientere dig i dette informationskort forud for samtalen.

- Gravide er i øget risiko for alvorlig sygdom ved covid-19 smitte, herunder øget risiko for indlæggelse på intensiv afdeling, respiratorbehandling og for maternel død. Omend øget, er risikoen for alvorlig sygdom dog stadig sjælden (2.2/100.000)
- Smitte med Covid-19 under graviditeten øger risikoen for kejsersnit, præterm fødsel med mulige senfølger for barnet og indlæggelse på neonatal afdeling samt for perinatal død
- Risikoestimaterne varierer fra land til land, i denne beslutningsstøttehjælper anvendes danske tal
- Beslutningshjælperen er opdateret med tallene fra delta-bølgen (juni – november 2021)
- I denne periode er set 31 tilfælde med alvorlig covid-19 smitte. 29 af disse kvinder var ikke vaccinerede, 2 ikke færdig-vaccinerede.
- De antistoffer kroppen danner som reaktion på vaccinationen kan overføres via placenta og modermælk til barnet. Antistofferne vil beskytte barnet mod Covid-19, men graden heraf kendes ikke
- Der mangler fortsat fase 3 og 4 studier af vaccinen hos gravide og ammende. Ligeledes er der endnu ikke data på langtidsopfølgning efter vaccination

Du kan holde dig opdateret om Covid-19 på DSOG's hjemmeside: https://www.dsog.dk/covid19



God fornøjelse.

4 Bivirkninger til COVID-19 vaccinationen

Mere end 1 ud af 10



Lokal reaktion ved indstikssted




Influenzalignende symptomer, fx hovedpine, muskelsmerter, feber (kan være høj)



Kvalme, opkastninger, diarre

1 ud af 100



Hævede lymfeknuder



Overfølsomhedsreaktioner med kløe og udslæt

1 ud af 1000 eller færre




Ansigtslammelse



Allergisk shock

4 Risiko for smitte med svær covid-19 under graviditeten hos ikke-vaccinerede



8 ud af 1000 ikke-vaccinerede gravide kvinder vil blive smittet med svær covid-19.
Risikoen for at blive smittet afhænger bl.a. af det aktuelle smittetryk

4 Komplikationer hos 31 danske kvinder med svær covid-19



14 ud af 31 havde behov for iltbehandling til mor



7 ud af 31 havde behov for indlæggelse af mor på intensiv afdeling



- 11 ud af 31 fødte for tidligt
- 11 ud af 31 mistede barnet