

4 NOAK



+ Fordele



Nedsætter risikoen
for (ny) blodprop



Sjældent
blodprøvekontrol



Påvirkes ikke
af kost



Fire
forskellige
præparater



Forholdsvis
mindre risiko
for blødning i
hjernen (ift.
Marevan)

÷ Ulemper



Forholdsvis større
risiko for blødning i
mave-tarm (ift.
Marevan)




Ekstra vigtigt at
huske medicin



Måske mindre
påvirkning fra
kosttilskud og
anden
medicin




Kontrol af
nyre-og lever
tal



22-24
kr/dagligt




+ Fordele



Nedsætter risikoen
for (ny) blodprop




Forholdsvis mindre
risiko for blødning i
mavearm (ift.
NOAK)



Kendt modgift



Mulighed for
selvtest i eget
hjem




2-4 kr/dagligt

÷ Ulemper



Forholdsvis større
risiko for blødning i
hjernen (ift. NOAK)




Jævnlig
blodprøvekontrol



Påvirkes af
kost



Vigtigt at
huske
medicin



Påvirkning fra
kosttilskud og
anden
medicin

4

Ingen blodfortyndende medicin




+ Fordele



Ingen højere blødningsrisiko



Ikke tage medicin



Økonomi

÷ Ulemper



Forholdsvis øget risiko for
(ny) blodprop



Bekymring hos
patienten



Bekymring hos
pårørende

4

Patienthistorier



Jeg har valgt Marevan, da det giver mig tryghed at blive eftersat mindst hver 6. uge.

Patient, 75 år

For mig er det vigtigt at kunne spise hvad jeg vil.
Jeg har valgt NOAK.

Patient, 82 år

Det vigtigste for mig, er den mindst mulige risiko for at få en hjerneblødning.
Jeg har valgt NOAK.

Patient, 82 år

Jeg får Marevan, da jeg ikke råd til NOAK, men når jeg får arbejde, vil jeg på NOAK, da jeg ikke ønsker at selvteste.

Patient, 53 år

Jeg foretrækker NOAK, da jeg pga. arbejde ikke vil bruge tid på blodprøvekontrol.

Patient, 42 år

4

NOAK versus Marevan ved behandling af venøs blodprop




NOAK



Antal patienter med blødning under NOAK
behandling

Marevan



Antal patienter med blødning under Marevan
behandling

Kildehenvisning, se bagside af beslutningshjælper

