

4

Operation (fjernelse af galdeblæren)



+ Fordele



Undgå
galdestensanfald



Undgå bekymring for
fremtidige
galdestensanfald



Vanlig aktivitet kan
oftest genoptages
1-2 uger efter
operation



Undgå
begrænsninger i
livskvaliteten

÷ Ulemper



Vedvarende gener
hos 1 ud af 3



Risiko for ikke-
alvorlige
komplikationer*



Risiko for
vedvarende
tynd afføring



Risiko for
ændring til
åben
operation



Risiko for
sjældne
alvorlige kom-
plikationer**

*Blødning, infektioner eller sårproblemer. **Skader på galdeveje ved 3 ud af 1000 operationer. Desuden skader på tarm og større blødning.

4

Ingen operation



+ Fordele



Ingen risiko for komplikationer



Galdesten er som udgangspunkt ufarlige og giver meget sjældent alvorlig sygdom



Ingen sygemelding



Ingen operationsar

÷ Ulemper



Bekymring om fremtidige galdestensanfald



Risiko for forværring af gener



Behov for smertestillende medicin ved galdestensanfald

4

Patientudsagn



Det er vigtigt for mig at kunne leve mit liv, som jeg vil og ikke være begrænset af kosten. Jeg er sund og rask og er ikke bekymret for at få smerter bagefter operationen.

Mand 66 år

Jeg har valgt operation. Mine galdestensanfald har jeg ofte og alt for længe. Og jeg er svækket i forvejen med mit helbred. Og jeg vil gerne have mere overskud i min hverdag – også til mine børn, og det er voldsomt for dem at se på.

Kvinde 38 år

Jeg valgte ikke at blive opereret, idet mine symptomer ikke var så betydelige endnu. Lægens ord om, at galdesten ikke er farligt og bliver til kræft, var afgørende for, at jeg valgte at se tiden an.

Kvinde 65 år

Jeg har fravalgt operationen lige nu og vil se tiden an, fordi jeg har oplevet en forbedring fra 3 uger mellem anfald til, at det nu er 6 uger siden, jeg sidst har haft et anfald.

Mand 37 år

