

4

Kemoterapi - enkeltstof (carboplatin)



+ Fordele



Færre bivirkninger
end ved flerstofs-
behandling



Intet hårtab



Tåles normalt godt



Symptomlindring


÷ Ulemper



Kvalme



Nedsat
immunforsvar



Træthed




Mindre effekt end
ved
flerstofsbehandling

4

Kemoterapi - tostofsbehandling (carboplatin/caelyx)



+ Fordele



Øget chance for
effekt i forhold til
enkeltstof



Sjældent hårtab



Tåles normalt godt



Bedre
symptomlindring end
ved enkeltstof

÷ Ulemper




Større risiko for
bivirkninger end ved
enkeltstof



Kvalme



Nedsat
immunforsvar



Træthed



Påvirkning af
hud og
slimhinder

4

Vedligeholdelsesbehandling efter kemoterapi (PARP-hæmmere) - BRCA-mutation



+ Fordele



Udsætter ofte tiden til ny kemoterapi



Kontrol over sygdommen



Understøtter dit behov for aktivt at gøre noget



Tåles normalt godt

÷ Ulemper



Ingen behandlingspause



Risiko for bivirkninger



Flere besøg på hospitalet



Større indgriben i din hverdag

4

Operation + kemoterapi



+ Fordele



Synlig sygdom skæres væk



Forlænger tid til tilbagefald
med 5 til 6 måneder i
gennemsnit

÷ Ulemper



Risiko for alvorlige
komplikationer



Operation forhindrer
ikke nyt tilbagefald



Operation gavner
kun hvis synlig
sygdom kan fjernes



Forudsætter
efterfølgende
kemoterapi

4

Observation



+ Fordele



Udsætter ofte tiden
til kemoterapi



Mindre indgriben i
din hverdag



Ingen sikker forskel i
overlevelse mellem
opstart af behandling
nu eller senere



Bedre livskvalitet

÷ Ulemper



Behandler ikke sygdommen



Risiko for
sygdomsforværring,
så du ikke kan tåle
behandling



Øget bekymring

4

Forsøgsbehandling + standardbehandling



+ Fordele



Mulighed for at få tilbudt ny
behandling



Ofte tæt kontrol af
din sygdom



Kan være til gavn for
dig selv og
kommende patienter

÷ Ulemper



Risiko for ukendte
bivirkninger



Usikker virkning



Ofte flere besøg på
hospitalet

4

Vedligeholdelsesbehandling efter kemoterapi (bevacizumab)



+ Fordele



Udsætter tiden til
kemoterapi



Kontrol over
sygdommen



Understøtter dit
behov for aktivt at
gøre noget



Tåles normalt godt

÷ Ulemper



Ingen
behandlingspause



Forhøjet blodtryk



Nyrepåvirkning




Blodprop

4


Kemoterapi - tostofsbehandling (carboplatin/paclitaxel)



+ Fordele



Øget chance for effekt i
forhold til enkeltstof



Symptomlindring



Tåles normalt godt

÷ Ulemper



Træthed



Smerter i muskler og
led



Nedsat
immunforsvar



Hårtab



Føleforstyrrelser

4

Patienthistorier



Jeg valgte at blive opereret, fordi jeg havde brug for at få kræften ud af min krop.

-Patient, 64 år

Jeg fravalgte behandling, fordi jeg hellere vil have en god periode uden bivirkninger.

-Patient, 87 år

Jeg valgte at få samme kemoterapi, som jeg har fået tidligere. Den gjorde mig kræftfri i 3,5 år.

-Patient, 56 år

Når jeg har det godt nu, vil jeg hellere vente lidt med behandling. Jeg har fået at vide, at det er uvist om jeg med tidlig behandling lever længere alligevel, og så vil jeg hellere undgå bivirkningerne så længe jeg kan.

-Patient, 60 år

Jeg valgte et forsøg som supplement til den traditionelle kemobehandling. Så følte jeg, at jeg var mere sikker på at blive rask.

-Patient, 60 år

Jeg syntes jeg havde for mange bivirkninger af den første kemobehandling, så derfor valgte vi en anden kemobehandling efterfulgt af en PARP-hæmmer.


Patient, 46 år

4


Statistik // Tidlig opstart vs. senere opstart af kemoterapi



Tidlig opstart



Senere opstart




Platin sensitiv recidiv 54% vs 55%. Patienter uden restsygdom og normal CA-125 efter 1. linje

4


Statistik // Carboplatin vs. Carboplatin/Caleyx



Carboplatin



Carboplatin/Caleyx



Platin sensitiv recidiv. Carboplatin 45 % (33-45%) vs.
Carboplatin/Caelyx 60%

