

# 4

## Kemoterapi - enkeltstof (capecitabin-tabletter)



### + Fordele



Leve et almindeligt liv i længere tid



Fremmøde  
(hver 3. uge)



Effekt

### ÷ Ulemper



Kvalme



Diarré



Hudgener



Ændret smagssans




# 4

## Kemoterapi - tostofsbehandling (folfiri)



### + Fordele



Større effekt end med enkeltstof



Bedre symptomlindring end med enkeltstof

### ÷ Ulemper



Pumpe med hjem



Diarré



Hårtab



Kvalme




# 4

## Kemoterapi - trestofsbehandling (folfoxiri)



### + Fordele



Større effekt end med et  
eller to kemostoffer



Bedre symptomlindring end  
med to kemostoffer

### ÷ Ulemper



Diarré



Kvalme



Føleforstyr-  
relser



Pumpe med  
hjem



Hårtab




# 4

## Kemoterapi - tåstofsbehandling (oxaliplatin)



### + Fordele



Større effekt end med enkeltstof



Bedre symptomlindring end med enkeltstof

### ÷ Ulemper



Føleforstyrrelser



Diarré



Kvalme



Ændret smagssans



Hudgener





# 4

## Antistof - bevacizumab



### + Fordele



Tåles godt af de fleste



Større effekt end med  
kemoterapi alene

### ÷ Ulemper



Forhøjet blodtryk



Lille risiko for  
blodpropper



Meget lille risiko for  
hul på tarmen



Lette blødninger




# 4

## Antistof - EGFR-hæmmer



### + Fordele



Større effekt end med  
kemoterapi alene



Bedre symptomlindring end  
med kemoterapi alene

### ÷ Ulemper



Udslæt



Andre hudgener



Slimhindegener




# 4

## Forsøgsbehandling



### + Fordele



Prøve nye behandlinger



Bidrage til ny viden

### ÷ Ulemper



Flere besøg, blodprøver og undersøgelser



Uvished



# 4

## Ingen behandling



### + Fordele




Ingen bivirkninger



Mere tid derhjemme lige nu

### ÷ Ulemper



Tidligere forværring af  
kræften og symptomer



Tidligere død





# 4

## Immunterapi



### + Fordele



Væsentlig bedre effekt end  
kemoterapi



Bedre livskvalitet



Færre besøg end  
ved kemoterapi



Lungepåvirkning



Hududslæt



Påvirkning af  
stofskifte



Diarré



# 4

## Patienthistorier



Det var vigtigt for mit valg, at vide, at det ikke er sidste mulighed. Jeg tror ikke jeg ville vælge mere behandling, hvis det var sidste mulighed.

-Patient, kvinde, 46 år

...behandling eller ej, når jeg nu ikke kan blive rask... Det var svært at beslutte det der var godt for mig. Men snakken med lægen om virkning op imod gener og ubehag, gjorde det mindre svært at beslutte mig for behandling, og så se hvordan det går... Vil jo gerne se mit barnebarn blive student til sommer.

-Patient, mand, 68 år

Havde vi vidst at mor ville få det så hårdt af behandlingen, og så få gode dage, havde vi nok valgt ikke at presse så meget på, for at hun skulle vælge behandling. Godt at vi fik en samtale med lægen, så valget om at stoppe blev lettere.

-Pårørende til patient, kvinde 60 år

Tålte behandlingen meget dårligt. Havde besluttet at stoppe, men med en tilpasning af behandlingen (nedsat dosis) valgte jeg at fortsætte.... Jeg vil gerne leve så længe som muligt.


-Patient, 57 år



# 4 Hvor meget forlænger behandling livet



Capecitabin




Dette er et eksempel. Mange andre forhold kan spille ind for den enkelte



# 4 Hvor meget forlænger behandling livet



2 stoffer



Dette er et eksempel. Mange andre forhold kan spille ind for den enkelte






# 4 Hvor meget forlænger behandling livet



3 stoffer



Dette er et eksempel. Mange andre forhold kan spille ind for den enkelte

