

4

Kemoterapi - Enkelt stof (Capecitabin tabletter)



+ Fordele



Leve et almindeligt liv i længere tid



Fremmøde (3. uge)



Effekt

÷ Ulemper



Kvalme og opkastning



Diarré



Hudgener



Træthed

4

Kemoterapi - kombination (folfiri)



+ Fordele



Større effekt end enkeltstof
kemoterapi



Symptomlindring


÷ Ulemper



Pumpe med hjem



Diarre'



Træthed



Kvalme og opkast

4

Kemoterapi - kombination (folfoxiri)



+ Fordele



Større effekt end et eller to
stoffer



Symptomlindring

÷ Ulemper



Diarre'



Kvalme/opkast



Føleforstyrrelser



Pumpe med hjem

4

Kemoterapi - kombination (med oxaliplatin)



+ Fordele



Større effekt end
kemoterapi alene



Symptomlindring

÷ Ulemper



Føleforstyrrelser



Diarre'



Kvalme/opkast

4

Antistof - Bevacizumab



+ Fordele



Få bivirkninger



Større effekt end
kemoterapi alene

÷ Ulemper



Ofte forhøjet blodtryk



Lille risiko for blødning og
blodpropper

4

Antistof - EGFR hæmmer



+ Fordele



Større effekt end
kemoterapi alene

÷ Ulemper



Udslæt



Rødme/infektion ved
neglebånd




Hud og
slimhindegener

4

Forsøgsbehandling



+ Fordele



Prøve nye behandlinger



Bidrage til ny viden

÷ Ulemper



Flere besøg, blodprøver og undersøgelser



Uvished

4

Symptomlindrende behandling uden kemoterapi



+ Fordele



Ingen bivirkninger til
behandling



Mere tid derhjemme lige nu

÷ Ulemper



Tidligere udvikling af
kræften og symptomer



Tidligere død

4

Patienthistorier



Det var vigtigt for mit valg, at vide, at det ikke er sidste mulighed. Jeg tror ikke jeg ville vælge mere behandling, hvis det var sidste mulighed.

-Patient, kvinde 46 år

...behandling eller ej, når jeg nu ikke kan blive rask... Det var svært at beslutte det der var godt for mig. Men snakken med lægen om virkning op imod gener og ubehag, gjorde det mindre svært at beslutte mig for behandling, og så se hvordan det går... Vil jo gerne se mit barnebarn blive student til sommer.

-Patient, mand, 68 år

Havde vi vidst at mor ville få det så hårdt af behandlingen, og så få gode dage, havde vi nok valgt ikke at presse så meget på, for at hun skulle vælge behandling. Godt at vi fik en samtale med lægen, så valget om at stoppe blev lettere.

-Pårørende til patient, kvinde 60 år

Tålte behandlingen meget dårligt. Havde besluttet at stoppe, men med en tilpasning af behandlingen (nedsat dosis) valgte jeg at fortsætte.... Jeg vil gerne leve så længe som muligt.

-Patient, 57 år

