

4

Kemoterapi - enkeltstof (caelyx)



+ Fordele



Øger chancerne for at
bringe sygdommen i ro



Symptomlindring




Sjældent hårtab

÷ Ulemper



Påvirkning af hud og
slimhinder



Træthed



Nedsat
immunforsvar

4

Kemoterapi - enkeltstof (topotecan)



+ Fordele



Øger chancerne for at
bringe sygdommen i ro




Symptomlindring

÷ Ulemper




Hårtab/udtynding



Træthed



Nedsat
immunforsvar



Tidskrævende - flere
behandlingsdage

4

Kemoterapi - enkeltstof (ugentlig taxol)



+ Fordele



Øger chancerne for at
bringe sygdommen i ro



Symptomlindring




Tåles normalt godt

÷ Ulemper



Hårtab



Tidskrævende
ugentlig behandling



Føleforstyrrelser



Lille risiko for nedsat
immunforsvar

4

Observation



+ Fordele



Udsætter tiden til
kemoterapi



Mindre indgriben i
din hverdag



Bedre livskvalitet



Ingen sikker forskel i
overlevelse mellem
opstart af behandling
nu eller senere

÷ Ulemper



Behandler ikke
sygdommen/symptomer



Risiko for
sygdomsforværring,
så du ikke kan tåle
behandling



Øget bekymring

4

Forsøgsbehandling + standardbehandling



+ Fordele



Mulighed for at få tilbudt ny
behandling



Ofte tæt kontrol af
din sygdom



Kan være til gavn for
dig selv og
kommende patienter

÷ Ulemper



Risiko for ukendte
bivirkninger



Usikker virkning



Ofte flere besøg på
hospitalet

4

Vedligeholdelsesbehandling efter kemoterapi (bevacizumab)



+ Fordele



Udsætter ofte tiden
til ny kemoterapi



Kontrol over
sygdommen



Understøtter dit
behov for aktivt at
gøre noget



Tåles normalt godt

÷ Ulemper



Ingen
behandlingspause



Forhøjet blodtryk



Nyrepåvirkning



Blodprop

4

Forsøgsbehandling



+ Fordele



Mulighed for at få tilbudt ny
behandling



Ofte tæt kontrol af
din sygdom



Kan være til gavn for
dig selv og
kommende patienter

÷ Ulemper




Risiko for ukendte
bivirkninger



Usikker virkning



Ofte flere besøg på
hospitalet



Fravalg af
standardbehandling

4

Patienthistorier



Den første kemobehandling virkede ikke efter hensigten, derfor valgte vi en anden kemobehandling og bevacizumab.

-Patient, 46 år

Jeg hørte om et forsøg og talte med min onkolog om det. Vi var enige om, at det var det rigtige for mig. Indsigt og selvbestemmelse er vigtig for mig.

-Patient, 60 år

Når jeg har det godt nu, vil jeg hellere vente lidt med behandling. Jeg har fået at vide, at det er uvist om, jeg med tidlig behandling lever længere alligevel, og så vil jeg hellere undgå bivirkningerne så længe jeg kan.

-Patient 60 år

Jeg fravalgte behandling, fordi jeg hellere vil have en god tid uden bivirkninger.

-Patient, 87 år

Jeg valgte en traditionel kemobehandling i stedet for forsøgsbehandling, fordi jeg var mere tryk ved den traditionelle behandling.

-Patient, 56 år

