

4

Afventende forløb



+ Fordele



Mulighed for at kroppen selv starter processen



Ingen behandling



Tid til sorgproces og accept

÷ Ulemper



Øget infektions risiko



Langstrakt forløb



Kontrol forløb



Fire ud af fem oplever at aborten ikke går i gang af sig selv

4

Medicinsk abort



+ Fordele



Nedsat
infektionsrisiko/
skånsomt for
livmoderen



Opstart af
behandling i dag



Kan foregå hjemme



Understøtter
kroppens naturlige
proces

÷ Ulemper



Blødning i op til 4
uger



Der skal være en
voksen person hos
dig



En ud af fem
oplever at
ikke alt væv
kommer ud



Er forbundet
med kraftige
menstruations
smerter



Kontrolforløb

4

Kirurgisk abort



+ Fordele



Sjældent behov for
efterbehandling




Kortere blødnings-
og behandlingsforløb



Ingen efterkontrol

÷ Ulemper



Fuld bedøvelse



Øget infektionsrisiko



Risiko for
komplikationer ved
operationen

4

Patienthistorier



"Min krop havde slet ikke reageret på at noget var galt. Derfor ville jeg heller ikke kunne tro på at det var noget min krop selv kunne klare. Desuden stod ferien lige for døren og det skulle bare overstås nu."
Kvinde 33 år (Kirurgisk indgreb)

"Jeg var bare glad for at kunne komme i gang med behandling allerede i dag. Jeg valgte derfor medicinsk behandling."
Kvinde 31 år

"Da graviditeten er gået til grunde meget tidligt, tror jeg det er bedst og mest naturligt for min krop, hvis den selv kan klare det - med medicinsk hjælp".
Kvinde 32 år

"Jeg havde behov for at det tog den tid som kroppen bestemte."
Kvinde 37 år (afventende forløb)

"Jeg oplevede et langtrukket og kompliceret forløb og jeg havde bare brug for at få det overstået, så jeg kunne komme videre. Derfor valgte jeg et kirurgisk efterforløb."
Kvinde 27 år

4

Statistik // Medicinsk abort




Effekt ved medicinsk abort



16 ud af 100 vil have brug for efterbehandling

Risiko for infektion ved medicinsk abort



1 ud af 100 vil opleve infektion efter medicinsk abort

4

Statistik // Kirurgisk abort




Effekt ved kirurgisk abort



3 ud af 100 vil have brug for efterbehandling

Risiko for infektion ved kirurgisk abort



2 ud af 100 vil opleve infektion efter kirurgisk abort

