

4

Operation for lyskebrok



+ Fordele



Gener fra brokket
forsvinder



Vanlig aktivitet kan
genoptages hurtigt



Forhindrer forværring
i gener*



Bedre kosmetisk
udseende

*Brokket tiltager i størrelse eller giver anledning til yderligere ømhed, bevægelsesindskrænkning etc.

÷ Ulemper



Risiko for
efterfølgende
kroniske smerter*



Bivirkninger til fuld
bedøvelse



Operationsar



Risiko for, at
brokket
kommer
tilbage**



Forbigående
rejseforbud

*Op til 12 ud af 100 får lette kroniske smerter, 1-3 ud af 100 får moderate til svære kroniske smerter. ** <5 ud af 100 får reoperation

4

Ingen operation for lyskebrok



+ Fordele



Ingen risiko for komplikationer til operation*



Ingen sygemelding efter operation



Intet net



Brok er som udgangspunkt en godartet og ufarlig tilstand



Intet operationsar

*Hyppige ikke alvorlige komplikationer: Fx blå mærke, væskeansamling og betændelse i såret

÷ Ulemper



Risiko for indeklemning af tarm



Risiko for tiltagende størrelse af brok



Risiko for forværring af symptomer



Kosmetiske gener af brokket

4

Operation for mindre bugvægsbrok



+ Fordele



Gener fra brokket forsvinder



Vanlig aktivitet kan genoptages hurtigt



Forhindrer forværring i gener*



Bedre kosmetisk udseende

*Brokket tiltager i størrelse eller giver anledning til yderligere ømhed, bevægelsesindskrænkning etc.

÷ Ulemper



Risiko for efterfølgende kroniske smerter*



Bivirkninger til fuld bedøvelse



Operationsar



Risiko for, at brokket kommer tilbage**



Forbigående rejseforbud

*Op til 12 ud af 100 får lette kroniske smerter, 1-3 ud af 100 får moderate til svære kroniske smerter. ** <5 ud af 100 får reoperation

4

Ingen operation for mindre bugvægsbrok



+ Fordele



Ingen risiko for komplikationer til operation*



Ingen sygemelding efter operation



Intet net



Brok er som udgangspunkt en godartet og ufarlig tilstand




Intet operationsar

*Hyppige ikke alvorlige komplikationer: Fx blåt mærke, væskeansamling og betændelse i såret

÷ Ulemper



Risiko for indeklemning af tarm



Risiko for tiltagende størrelse af brok



Risiko for forværring af symptomer



Kosmetiske gener af brokket

4

Patienternes oplevelser



En af de ting, der gjorde, at jeg ikke var i tvivl, var, at lægen sagde, at hvis jeg blev opereret, så ville der være en risiko for, at jeg kunne få kroniske smerter som en gene efter operationen. Der gjorde jeg op med mig selv, da jeg ikke er så voldsomt generet af den her knude, at jeg hellere ville leve med, at den er der, end at jeg vil risikere at få endnu flere smerter ved at blive opereret.

Patient, 62 år

Jeg skal opereres. Lægen fortalte, at det var en god ide, og jeg læner mig op ad lægens ord. Jeg vil gerne opereres, da der er ting, som jeg ikke kan i min hverdag uden, at det gør ondt. Og så gammel er jeg heller ikke. Jeg vil gerne være aktiv i min hverdag.

Patient, 67 år

Jeg skal ikke opereres. Efter en snak med lægen forstod jeg, at det ikke var nødvendigt. Jeg har ingen gener i det daglige, og jeg vil ikke risikere, at jeg får ondt bagefter. Og da slet ikke når jeg ikke har ondt nu. Hvis det begyndte at gøre ondt, var jeg velkommen igen, sagde lægen. Det, lægen siger, betyder meget.

Patient, 71 år

Jeg skal opereres. Jeg har ondt hver dag og kan ikke lege med ungerne. Det er så irriterende, at jeg bliver hæmmet i min hverdag. Jeg ved godt, at der er risiko for kroniske smerter, men jeg ser ikke tallene som slemme, så jeg vil gerne opereres med den risiko, der er. Mine børn og mit aktive liv er grunden til det.

Patient, 42 år

