

4

Kemoterapi - enkeltstof CARBOPLATIN



+ Fordele



Færre bivirkninger
end ved
kombinations-
kemoterapi



Ingen hårtab



Tåles normalt godt



Symtomlindring


÷ Ulemper



Kvalme



Nedsat
immunforsvar



Træthed



Smerter i muskler og
led

4

Kemoterapi - kombination - CARBOPLATIN/CAELYX



+ Fordele



Øget chance for
effekt i fht. enkeltstof
kemoterapi



Sjældent hårtab



Tåles normalt godt



Symtomlindring

÷ Ulemper




Større risiko
for
bivirkninger
end ved
enkeltstof



Kvalme



Nedsat
immunforsvar



Træthed



Smerter i
muskler og
led



Påvirkning af
hud og
slimhinder

4

Bevacizumab



+ Fordele



Udsætter tiden til ny
kemoterapi



Kontrol over
sygdommen



Understøtter dit
behov for aktivt at
gøre noget



Tåles normalt godt

÷ Ulemper



Ingen
behandlingspause



Forhøjet blodtryk



Nyrepåvirkning



Blodprop

4

Vedligeholdelses behandling med PARP-hæmmere (BRCA-mutation)



+ Fordele



Udsætter tiden til ny
kemoterapi



Kontrol over
sygdommen



Understøtter dit
behov for aktivt at
gøre noget



Ekstra behandlings-
mulighed

÷ Ulemper



Ingen
behandlingspause



Nedsat
immunforsvar



Gener fra mave-
tarmsystemet



Muligvis øget risiko
for blodkræft

4

Operation



+ Fordele



Synlig sygdom skæres væk



Forlænger i gennemsnit
overlevelsen med 7,5
måneder

÷ Ulemper



Risiko for alvorlige
komplikationer



Operation forhindrer
ikke nyt tilbagefald



Operation gavner
kun hvis synlig
sygdom kan fjernes

4

Observation



+ Fordele



Udsætter tiden til
kemoterapi



Mindre indgriben i
din hverdag



Ingen sikker forskel i
overlevelse mellem
opstart af behandling
nu eller senere



Bedre livskvalitet

÷ Ulemper



Behandler ikke sygdommen



Risiko for
sygdomsforværring,
så du ikke kan tåle
behandling



Øget bekymring

4

Forsøgsbehandling



+ Fordele



Chance for at få tilbudt ny
behandling



Ofte tæt kontrol af
din sygdom



Kan være til gavn for
dig selv og
kommende patienter

÷ Ulemper



Kan betyde fravalg af
standardbehandling



Risiko for ukendte
bivirkninger



Usikker virkning



Ofte flere besøg på
hospitalet

4

Patienthistorier



Jeg valgte at blive opereret, fordi jeg havde brug for at få kræften ud af min krop.

-Patient, 64 år

Jeg fravalgte behandling, fordi jeg hellere vil have en god periode uden bivirkninger.

-Patient, 87 år

Jeg valgte at få samme kemoterapi, som jeg har fået tidligere. Den gjorde mig kræftfri i 3,5 år.

-Patient, 56 år

Når jeg har det godt nu, vil jeg heller vente lidt med behandling. Jeg har fået at vide, at det er uvist om jeg med tidligt behandling lever længere alligevel, og så vil jeg hellere undgå bivirkningerne så længe jeg kan.

-patient, 60 år

Jeg valgte et forsøg som supplement til den traditionelle kemobehandling. Så følte jeg, at jeg var mere sikker på at blive rask.

-Patient, 60 år

Jeg syntes jeg havde for mange bivirkninger af den første kemobehandling, så derfor valgte vi en anden kemobehandling efterfulgt af en PARP-hæmmer.


Patient, 46 år

4


Statistik // Tidlig vs. opstart senere opstart af kemoterapi



Tidlig opstart



Senere opstart



Platin sensitiv recidiv 54% vs 55%. Patienter uden restsygdom og normal CA-125 efter 1. linje

4


Statistik // Carboplatin vs. Carboplatin/Caleyx



Carboplatin



Carboplatin/Caleyx




Platin sensitiv recidiv. Carboplatin 45 % (33-45%) vs.
Carboplatin/Caelyx 60%

4


Statistik // Operation + kemo vs. kemo alene



Operation + kemoterapi



Kemoterapi



Platin sensitiv recidiv. Positiv AGO score 40% (OP + Kemo) vs 22 % (Kemo alene)

4

Statistik // Operation + kemo vs. kemo alene



Operation + kemoterapi



I live efter 4 år



Ikke i live efter 4 år

Kemoterapi



I live efter 4 år



Ikke i live efter 4 år

