

4

Ingen behandling




+ Fordele



Slippe for at indtage medicin



Du skal ikke bekymre dig om bivirkninger



Du skal ikke bruge penge på medicin



Mulighed for at ændre mening

÷ Ulemper



Uændret risiko for fremtidige smerter relateret til brud



Uændret risiko for nedsat funktion i fremtiden




Husk en tid til opfølgning




Bekymring for forværring



+ Fordele



Nedsætter risikoen
for knoglebrud



Pris



Tablet 1 gang
om ugen



Foregår i
samarbejde
med egen
læge



Mulighed for
pause i
behandling

÷ Ulemper



Forholdsregler ved
indtag*



Risiko for lette
bivirkninger



Risiko for sjældne,
men alvorlige
bivirkninger




Besked til tandlæge

*Tages med et glas vand stående eller siddende. Undgå at spise, tage medicin eller lægge dig ned i 30 minutter efter indtag.


4 Zoledronsyre



+ Fordele



Nedsætter risikoen
for knoglebrud



Gratis



Behandling 1
gang årligt på
hospitalet



Kontrol med
blodprøver



Mulighed for
pause i
behandling

÷ Ulemper



Behandling med
drop på hospitalet



Besked til tandlæge



Risiko for
influenza-
lignende
symptomer




Risiko for
lette
bivirkninger



Risiko for
sjældne, men
alvorlige
bivirkninger



+ Fordele



Nedsætter risikoen
for knoglebrud



Foregår i
samarbejde med
egen læge




Ingen behov for nye
knoglescanninger



Halvårlige
behandlinger

÷ Ulemper



Pris



Livslang
behandling



Risiko for
lette
bivirkninger



Risiko for
sjældne, men
alvorlige
bivirkninger



Besked til
tandlæge




Du skal
stikkes
præcis hver
6. måned

4

Teriparatid




+ Fordele



Nedsætter risikoen
for knoglebrud



Hjemmebehandling




Opbygning af
knoglemasse



Kontrol med
blodprøver

÷ Ulemper



Pris



Du skal stikke dig
selv dagligt i 2 år



Opbevaring af
medicinen på køl




Risiko for lette
bivirkninger

4

Romosozumab




+ Fordele



Nedsætter risikoen
for knoglebrud




Hjemmebehandling



Gratis



Behandling 1
gang om
måneden i 1
år



Opbygning af
knoglemasse



Besked til tandlæge




Du skal stikkes eller
stikke dig selv



Opbevaring af
medicinen på
køl



Risiko for
lette
bivirkninger



Risiko for
sjældne, men
alvorlige
bivirkninger

4

Patienthistorier



Jeg har valgt at gå i gang med behandlingen. Den forventede effekt, og det, at jeg kun skulle til behandling en gang om året, lød fornuftig. Patient, 80 år.

Selvom jeg er bekymret for bivirkninger, er jeg også bekymret for osteoporose. Og så er det bare med at komme i behandling. Patient, 66 år.

Jeg havde ikke så mange muligheder pga. for højt kolesteroltal, men det betyder meget for mig, at det er besværligt at have medicinen på køl. Patient, 64 år.

Mine tal er ikke alarmerende og flere af de andre typer af osteoporosemedicin har jeg ikke kunnet tåle. Derfor har jeg besluttet at se tiden an uden behandling for at bevare min livskvalitet. Måske ændrer jeg holdning ved næste kontrol. Patient, 67 år.

Jeg var bekymret for kæbenekrose, men lægen fik mig beroliget. Patient, 64 år.

Vigtigt for mig, at behandlingen er overskuelig tidsmæssigt (1 år 1 gang pr. måned), og at jeg ikke behøver at stikke mig selv. Patient, 72 år.

4

Behandlingseffekt af Alendronat / Zoledronsyre for kvinder



Ingen behandling



65 ud af 100 oplever en fraktur

Behandling



33 ud af 100 kvinder oplever en fraktur

Andel af kvinder over 60 år med osteoporose, som oplever fraktur i løbet af livet - N. Nguyen, H. Ahlborg, J. Eisman, & T. Nguyen, 2007

4

Behandlingseffekt af Alendronat / Zoledronsyre for mænd



Ingen behandling



42 ud af 100 mænd oplever en fraktur

Behandling




21 ud af 100 mænd oplever en fraktur

Andel af mænd over 60 år med osteoporose, som oplever fraktur i løbet af livet - N. Nguyen, H. Ahlborg, J. Eisman, & T. Nguyen, 2007


4

Alendronat




4

Zoledronsyre



4

Denosumab




■ Én indsprøjtning på sygehus

■ Indsprøjtning hver 6. måned ved egen læge livslangt

■ Blodprøve 1-2 uger før behandling

4

Romosozumab



4

Teriparatid

