

4

Kemoterapi - kombination



+ Fordele



Øger chancen for at forblive
rask



Nedsætter risikoen
for tilbagefald af
tarmkræft



Øget chance for
effekt i forhold til
enkeltstof
kemoterapi

÷ Ulemper



Føleforstyrrel-
ser



Ændret
smagssans



Diarré



Kvalme og
opkast



Hudgener



Hjertesmerter

4

Kemoterapi - enkeltstof



+ Fordele



Øger chancen for at forblive
rask



Nedsætter risikoen
for tilbagefald af
tarmkræft



Færre bivirkninger
end kombinations
kemoterapi

÷ Ulemper



Diarré



Kvalme og opkast



Hudgener



Hjertesmerter



Ændret
smagssans

4

Ingen Kemoterapi



+ Fordele



Ingen bivirkninger
efter kemoterapi



Ingen senfølger efter
kemoterapi



Ikke tidskrævende



Nemmere ved at
passe arbejde og
privatliv

÷ Ulemper



Nedsætter chancer for at
forblive rask



Øget bekymring for
tilbagefald




Tilbagefald = ofte
sygdom der ikke kan
helbredes

4

Forsøgsbehandling



+ Fordele



Prøve nye behandlinger



Bidrage til ny viden

÷ Ulemper



Flere besøg og undersøgelser



Uvished

4

Patienthistorier



Vi var på vagt overfor kemo, og turde næsten ikke lave planer, men efter at have prøvet det, slapper jeg mere af.

-Patient, 51 år

Jeg tager behandlingen, da jeg griber det håb der er.

-Patient, 48 år

Når lægen fortæller, at bivirkninger måske ikke forsvinder, og at der ikke er stor forskel på, om jeg får behandling eller ej, så er jeg ikke i tvivl. Så vil jeg ikke have behandling. Jeg er blevet 75 år, så det går nok lidt endnu.

-Patient, 75 år

Information på det rigtige tidspunkt er vigtig. Da jeg skulle beslutte, om jeg skulle få nedsat min kemo, havde det været rart at vide, at det er helt almindeligt og at andre også får deres dosis sat ned i deres forløb.

-Patient, 57 år

4

Lav-risiko, eksempel for 100 personer på 65 år opereret for tarmkræft.



Dette er et eksempel. Mange andre forhold kan spille ind for den enkelte.

4


Høj-risiko, eksempel for 100 personer på 65 år opereret for tarmkræft.



Dette er et eksempel. Mange andre forhold kan spille ind for den enkelte.

4

Høj-risiko, eksempel for 100 personer på 65 år opereret for tarmkræft.




Dette er et eksempel. Mange andre forhold kan spille ind for den enkelte.

4

Lav-risiko, eksempel for 100 personer på 65 år opereret for tarmkræft.



- I live pga. operation alene
- I live pga. enkeltstof kemoterapi
- Død af kræft eller andre sygdomme
- I live pga. 2 slags kemoterapi - kombination



Dette er et eksempel. Mange andre forhold kan spille ind for den enkelte.

4 Valgmulighed:



+ Fordele

.....
.....
.....

.....
.....
.....

÷ Ulemper

.....
.....
.....

.....
.....
.....

